Aurora blanc = CG 91-560 (par erre Vass3R04s596-600



FINA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1720

384 To 7720

3674

0Mtp1720

Aurora blanc = CG 91-560 (par erreui

Vass3R04s596-600

SP.

alautoniantaukumaliaitaul

77 | 10





71 4 ndontondontondontondontond N° d'ordre :

Désignation : 6691-560

Emplacement: 3 R 4 A 5 96- 600

THE BOURGEONNEMENT

Epanoui (182) - moven 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - seloux 186 - veloute 187 - aranéeux 788 - duvetoux 189 cotonneur 190 - sans villosita pubascenta 278 - sans villosita

laineuse 279.

Blanc 191 - faure ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé popjaune 195 - à places bronzées ou cuivrées 196 - entiègement bronzé ou cuivrs 197 wort (98)

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en graffière - outres.

Face inférieure - glabres (799) - séteuses 200 - veloutées 201 -

aranéeuses (02) Auveteuses 201 - cotomeuses 204 - sans willogité pubescente 280) sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 20% - fauves ou rousses 206 - carminées 20% à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou outurées (10) entièrement bruzées ou ouivrées 211 - vertes 219 - autres 213.

(Dans le cas ou la première feutille détachée est à lisété carminé, la couleur de la 22me et de la 32me feuille détachées mere notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieur

Nervures : glabre (11) - seteur 215 - velouté 216 - aranseux (217) duvetoux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente (m) san villosité laineuse 283.

Limbe : glabre (20) - séteux 2/1 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans willosits pubescente 284 sans villosité laineuse (85).

A limbo plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieur

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à mlages bronzées ou cuivrées 231) - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233,

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 · cotonneux 239 - sans villocité pubescente (R6) - sans villosité lainouse 287

Totalement - sillen - partiellement.



N* d'ordre :

Désignation : CG 91.560

Emplacement: 3 R 4 D. 596.600

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

7/10 yr

Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année: 1998

Code clone

Observateur: Lacombe

Code cépage

Emplacement : 3 RH \$596_600

Nom cépage : CG 3.1-560

Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne 5)- grande 7 - très grande 9.

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 - cinq(3) sept(4 - plus de sept 5

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5)- vert foncé 7.

oiv 070 pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe : nulle (1) point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigm. antho. nerv. face inf. limbe: nulle o- point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 072 gaufrure limbe (entre nervures II et III) : absente 1)- présente 9.

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I et II) : absente 1) présente 9.

oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4)- tourmenté 5)

oiv 075 cloqure face supérieure limbe : nulle ou très faible 1 - faible 3)- moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible(1) faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1)- faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible (1)- faible 3 movenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087* densité poils dressés face inférieure : nulle ou très faible(1) faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1)- présente 9. oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1)- présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court 1 - plus court 3 / égal 5 plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 / faible 3 - moyenne 5 - forte 7 -

Couleur du pétiole : vert 178 - partiellement coloré 177 - coloré 176.

Formulaire de description 5/8 (maturité)

Année: 1998

Observateur: Laconbe

Code cépage :

Code clone:

Nom cépage : C 6 91 560

Emplacement: 3 R4 A 596- 600 OK

Grappe I reule

oiv 202 longueur: très courte (<10cm) D- courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.

oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5- large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9.

oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne(5) compacte(7 - très compacte 9.

oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5)- long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement (1)- moitié 5 - plus de la moitié 7.

oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2.

oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4 Amportante

Baie

oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue

22 (20-26mm) (7)- très longue (>26mm) 9.

oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 3 - large (20-26mm)(7)- très large (>26mm) 9.

oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme (3)

oiv 223 forme: aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8.

oiv 225 couleur épiderme : vert jaune(1)- rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6.

oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme(2)

oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince(3)- moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9.

oiv 229 ombilic : peu apparent(1) - apparent 2.

oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée 1)- colorée 2.

oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée (1) - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9

oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse (1) juteuse 2.

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7)- très élevée 9.

oiy 236 saveur : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5

oiv 236* saveur : aucune 1 - goût muscat 2) - goût foxé 3 - autre 4.

oiv 238 longueur pédicelle: très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3- moyen (8-12mm) 5 - long

(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3) moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9

oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 32

oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) I - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes (1) - présentes 2

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

1998 Annec

Code cepage

Code clone

Nom cépage CG 91-560

Observatem TL

Emplacement : 3 R4 \$ 536_600

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique(3) aplatie 5.

oiv 102 surface : unic 1 - côtelée 2 - strice

oiv 103 couleur générale jaune D- brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4 à losse freus plates

oiv 104 lenticelles : absentes (1)- présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence 1), présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds absence (f) présence (f)

orv 353 longueur entrenocuds : fres courts (-60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5

longs (150mm) (7- (rés longs (>180mm) 9-

oiv 354 diamètre entrenoeuds : très petit (5mm) 1 petit (8mm) 3 moyen (41mm) 5 - grand

(14mm)(7) tres grand (-17mm) 9

Porte-grelle

oiv 551 rendement en bois/ha : tres faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - tres élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 faible 3 « moyen 5 » eles é 7 » très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse très faible 1 - faible 3 - moyen 5 éleve 1 très élevé 9

Vassal

Noemds aplatis I movens(2)- saillants 3

Viquen: 5